

T270 Comparação de desempenho de lactação de vacas leiteiras suplementadas com duas formulações diferentes de somatotropina bovina em um grande rebanho comercial de gado leiteiro no Brasil.¹

J. P. G. de Moraes,¹ I. A. P. da S. Cruz,² N. S. Minami,³ L. P. Veronese,⁴ T. A. Del Valle,⁵ and J. Aramini² * Departamento de Biotecnologia Vegetal e Animal, Universidade Federal de São Carlos, Campus Araras, Araras, SP 13600-970, Brazil. † Fundação de Apoio Institucional (FAI), Campus São Carlos, São Carlos, SP 13565-905, Brazil. ‡ Novometrix Research Inc., 4564 Nassagaweya-Puslinch Townline, Moffat, Ontario, Canada LOP 1J0

O objetivo deste estudo de campo, realizado de forma aleatória, foi avaliar o desempenho de lactação de vacas suplementadas com duas formulações diferentes de 500 mg de somatotropina bovina (bST). Sessenta vacas holandesas foram alocadas a um grupo controle (Sem bST), 90 vacas holandesas a uma formulação de bST à base de Vitamina E e Lecitina (VEL-bST) e 90 vacas holandesas a **Lactotropin™** (Elanco Saúde Animal). As análises foram feitas separadamente entre primíparas e múltiparas. Os tratamentos foram realizados a cada 14 dias iniciando aos 57-70 dias após o parto, até o final da lactação ou quando atingissem 17 aplicações. Antes da designação dos tratamentos, os animais foram pareados pela produção de leite, número da lactação e aleatoriamente alocados em um dos 3 grupos. Os parâmetros avaliados foram produção diária de leite, teor de proteína do leite, teor de gordura do leite, contagem de células somáticas (CCS) e escore de condição corporal (ECC). Durante o período de tratamento, os animais tratados com somatotropina (VEL-bST e **Lactotropin™** combinados) apresentaram aumento de produção média de leite, bem como a produção de gordura e proteína do leite ($p < 0,001$) quando comparado aos animais do grupo controle.

Primíparas tratadas com **Lactotropin™** apresentaram um desempenho de 37,75kg/dia de leite, significativamente superior aos 35,72kg/dia de leite produzidos por primíparas tratadas com VEL-bST ($p=0,003$), representando assim uma diferença de produção média de +2,03kg/dia de leite entre as primíparas tratadas com **Lactotropin™**.

Múltiparas tratadas com **Lactotropin™** apresentaram um desempenho de 40,13kg/dia de leite, significativamente superior aos 38,81kg/dia de leite produzidos por múltiparas tratadas com VEL-bST ($p=0,011$), representando assim uma diferença de produção média de +1,32kg/dia de leite entre as múltiparas tratadas com **Lactotropin™**.

As produções de gordura e proteína também foram diferentes para as vacas tratadas com bST em comparação com as vacas controle, tanto para vacas primíparas quanto para as múltiparas ($p < 0,001$). Os resultados são mostrados na Tabela 1.

Tabela 1. Desempenho produtivo de vacas leiteiras durante o tratamento com duas formulações diferentes de somatotropina bovina recombinante (bST)

	Primíparas				Múltiparas				Valor <i>P</i>				
Item	Controle	VEL- bST ¹	Lactotropin [™] ²	EPM ³	Controle	VEL- bST	Lactotropin [™]	EPM	Par	Trat ⁴	bST vs. Ctrl	VEL vs. Lactotropin [™]	Par x Trat
Produção (kg/dia)													
Leite	33,26	35,72	37,75	0,630	34,47	38,81	40,13	0,476	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	0,164
Gordura	1,07	1,11	1,18	0,030	1,08	1,19	1,23	0,023	0,167	<0,001	<0,001	0,001	0,156
Proteína	0,99	1,11	1,17	0,017	1,04	1,21	1,22	0,013	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	0,038
Composição do leite													
Gordura (%)	3,23	3,07	3,13	0,057	3,16	3,06	3,05	0,044	0,438	0,004	<0,001	0,482	0,584
Proteína (%)	3,00	3,10	3,09	0,022	3,02	3,12	3,06	0,017	0,828	<0,001	<0,001	0,027	0,256
Log CSS ⁵	3,52	3,65	3,44	0,120	4,54	4,48	4,57	0,091	<0,001	0,728	0,946	0,427	0,111
Escore de Condição Corporal	3,04	2,97	2,98	0,013	3,03	2,93	2,92	0,010	0,014	<0,001	<0,001	0,788	0,062

¹ bST à base de Vitamina E e Lecitina (VEL-bST).

² **Lactotropin™**, Elanco Animal Health.


³ EPM informados são para os tratamentos bST com 90 vacas cada um; EPM para o tratamento de controle são maiores em 10 a 15%, porque 60 vacas foram atribuídas a este tratamento.

⁴ Trat = tratamentos; Ctrl = controle; bST = VEL-bST e **Lactotropin™**; Par = paridade.

⁵ Log CSS = $\log_{10}$ da contagem de células somáticas.

Referência: 1. De Moraes et al. 2017. Lactation performance of Holstein cows treated with 2 formulations of recombinant bovine somatotropin in a large commercial dairy herd in Brazil. J. Dairy Sci. 100:1-12.

Lactotropin™, **Elanco™** e o logo da barra diagonal™ são marcas da Eli Lilly and Company ou suas afiliadas. © 06/2017. Elanco Saúde Animal. Todos os direitos reservados. BRDRYLAC00076



Objetivos do estudo:

Avaliar o desempenho de lactação de vacas suplementadas com duas formulações diferentes de 500 mg de bST: **Lactotropin™** e uma somatotropina à base de Vitamina E e Lecitina (VEL-bST)

Local do estudo:

Fazenda Santa Rita – Descalvado – SP

Grupos:

- Vacas de raça holandesa
- 35% Primíparas e 65% Múltiparas
- 90 animais tratados com **Lactotropin™**
- 90 animais tratados com VEL-bST
- 60 animais grupo controle

Tratamentos:

- Início aos 57-70 dias após o parto
- Aplicações a cada 14 dias
- Término ao final das lactações ou após 17 aplicações

Dados coletados:

- Produção de leite
- Teor de proteína do leite
- Teor de gordura do leite
- Contagem de células somáticas (CCS)
- Escore de condição corporal (ECC)

Resumo dos resultados:

- Primíparas tratadas com **Lactotropin™** produziram 2,03kg/dia de leite a mais que as tratadas com VEL-bST ($p=0,003$).
- Múltiparas tratadas com **Lactotropin™** produziram 1,32kg/dia de leite a mais que as tratadas com VEL-bST ($p=0,011$).

Elanco Saúde Animal

Divisão Eli Lilly do Brasil
Av. Morumbi, 8.264
CEP 04703-002

Elanco

0800 11 2690
www.elanco.com.br